

Written by

Saturday, 02 August 2008 12:38 -

இவ்வகையான சொறி அல்லது கரப்பானானது கட்டிலாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும். ஈரமான அல்லது அழுக்கான உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher) குழந்தைகளின் தோலில் சொறிவடை ஏற்படும்.

நோயின் அறிகுறிகள்: உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher) அணிந்த பகுதி சிவந்து போய் அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறப்பள்ளிகள் ஏற்பட்டு காணப்படும்.

உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher)யை கழற்றிவிட்டு அப்பகுதியை காற்றுப்பட விடவேண்டும். இவ்வகை நோய் ஏற்படாமலிருப்பதற்கு குழந்தை சிறுநீர் கழித்தபின்போ அல்லது மலம் கழித்தபின்போ ஓவ்வொரு முறையும் உறிஞ்சுடையை மாற்றிவிட வேண்டும். அத்துடன் குழந்தையின் கீழ் பகுதியை நீரினால் சுத்தமாக கழிவின்றாக ஈரமின்றி துடைத்தபின்பு நீரத்தைக்கக்கப்பிய வகையை சார்ந்த அதாவது Water Repellent Cream வகையை சார்ந்த பால்டேட்டைப் பாவிக்க வேண்டும்.

இந் நோய் சில நாட்களின் பின்பும் மாறாமல் இருப்பின் உங்கள் மருத்துவரையோ அல்லது சுகாதார அதிகாரியையோ (Health Visitor) காணுவது சிறந்ததாகும். சில வள்கைகளில் அவர்கள் இந் நோயின் இரணத்தை குறைப்பதற்கு Mild corticosteroid ஐ தரக்கூடும்.

Written by

Saturday, 02 August 2008 12:38 -

http://www.tamilhealth.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=92