

Written by

Monday, 28 July 2008 16:24 -

பெண்களை ஓரளவு பாதிக்கும். ஆண்களுக்குத்தான் பாதிப்பின் அளவு அதிகரிக்கும். காரணம், உறுப்பு விரைப்பின்மையே பிறச்சினகைகள் தோன்றும்.

நீ ரிழிவாள்ள பெண்கள் தாராளமாக கர்ப்பம் தரிக்கலாம். ஆனால் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பரேல்தான் கர்ப்பம் தரிக்கவேண்டும். குறிப்பாக இன்சுலினை உபயோகிக்கும் பெண்கள் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். காரணம், அதிக அளவு இன்சுலின் கருவையும் பாதிக்கக்கூடும். நாட்பட்ட நீ ரிழிவாக் காக பொதுவாக மாத் திரகைளை உபயோகிக்கும் பெண்கள் வேண்டாமானால் கர்ப்பம் தரிக்கலாம். ஆனால் இன்சுலின் எடுத்துக் கொள்ளும் பெண்கள் கர்ப்பத்ததைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நீ ரிழிவா உள்ள பெண்களுக்கு முதல் மாதவிலக்கு ஓரூ ஆண்டுகள் தள்ளிப் போகலாம். அடுத்தடுத்து ஏற்படும் மாத விலக்கு ஒழுங்கினை காணப்படும். பெரும்பாலும் இன்சுலின் எடுத்துக் கொள்ளும் பெண்களுக்குத்தான் பிரச்சினை. நீ ரிழிவகைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வதைத் திருந்தால் எந்தத் தொல்லையும் வராது.

பொதுவாக ஆண்மையான பதையால் பாலைவனம் விஷயத்தில் ஆணுறுப்பு விரைப்பதைக் குறிக்கிறார்கள். ஆணுறுப்பில் மீள வட்ட சிலிண்டர் போன்ற வடிவில் மென்மையான திசுக்கள் உள்ளன. பாலைவனம் வுத் துண்டித்தலின் போது இவகைகளுக்குத் தமனிகள் மீலமாக அதிக இரத்தம் பாய்கிறது. இதனால் பஞ்சுத் திசுக்கள் பெரிதாக உப்பி பல மடங்கு பெரிதாகிறது. நாட்பட்ட நீ ரிழிவாக் காரர்களுக்கு இந்தத் தமனியில் அழற்சி ஏற்படுவதால் சரியான ரத்த ஓட்டம் பாய்வதில்லை, இதனால் அதன் எழுச்சியும் குறைகிறது. தவையு ஏற்படுகிறது.

நீ ரிழிவா நோயுள்ளவர்கள் தாராளமாகத் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். பெரும்பாலான நீ ரிழிவா நோய்கள் சூமார் மூப்பத்ததைத் முதல் நாற்பது வயது வாக்கில் தான் வருகின்றன. இது இவர்களின் திருமண வாழ்க்கையை அல்லது குழந்தைப் பற்றை பாதிப்பதில்லை. இவர்களில் ஐம்பது விழுக்காட்டினர் ஐம்பது முதல் ஐம்பத்ததைத் வயது வாக்கில் தான் பாலைவனம் பிரச்சினகைளை சந்திக்கிறார்கள். <http://www.keetru.com/medical/sex/diabetes.php>